

مرکزی زیر انتظام حکومت جموں و کشمیر
محکمہ شیپ ہسینڈری کشمیر

وادی کے بھیڑ اور بکریاں پالنے والے حضرات کو موسم سرما میں اہم تر ابیر برتنے کی جانکاری

پناہ گاہ:-

- ☆ شیپ شید کو تقریباً 20. C گرم رکھنا چاہئے اور باہری ہوا آنے جانے کا بھی خاص خیال رکھا جائے تاکہ امو نیا گیس شید میں جمع نہ ہو پائے
- ☆ دیگر بیماریوں کو روکنے کے لئے شید کا فرش صاف سترہ اور خشک رکھنا ضروری ہے۔
- ☆ سردی سے بچنے کے لئے 4 تا 6 انچ کی تہہ جو کہ خشک پتوں یا بھوسے وغیرہ پر مشتمل ہو بچائی جائے۔
- ☆ جانوروں کے لئے زیادہ سے زیادہ جگہ فراہم کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ بڑے جانوروں کے لئے 10 مربع فٹ اور چھوٹے جانوروں کے لئے 6 مربع فٹ فی جانور۔
- ☆ مختلف قسم کے جانوروں کو شید میں الگ الگ رکھا جائے

غذائیت:-

- ☆ بڑے جانوروں کے لئے 500 گرام فید اور 1.5 کلو میکرو گھاس جبکہ چھوٹے جانوروں کے لئے 300 گرام فید اور ایک کلو میکرو گھاس فی دن کھلایا جائے
- ☆ آدھا کلو گرام کٹی ہوئی سبزیاں جیسے گا جر، مولی، شلغم وغیرہ اور ایک کلو گرام گھاس کی مقدار کے مطابق حاملہ بھیڑ کو دون میں دیا جانا چاہئے۔
- ☆ زیادہ تو انائی بھم پنچانے کے لئے 30 سے 60 گرام راب (MOLASSES) حاملہ بھیڑوں کو دون میں دیا جانا چاہئے۔
- ☆ فید سے تقریباً دو گھنٹے پہلے اور دو گھنٹے بعد بھیڑوں کو پانی دینے سے پرہیز کیا جانا چاہئے۔
- ☆ اس بات کو تینی بنا میں کہ موسم سرما کا ذخیرہ شدہ فید صاف سترہ اور میکرو گھاس غذائیت کا ہو۔
- ☆ بھیڑوں کو صبح سویرے چرانی کے لئے نہ بیجا جائے تاکہ وہ برف میں جی ہوئی گھاس کو کھانے سے بچیں ورنہ اس صورت میں برکسی (BRAXY) یا بیماری سے بہت بڑا انقصان ہو سکتا ہے۔
- ☆ موسم سرما کے دوران بھیڑ، بکریوں کو طاقتی غذائیت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے متعلقہ ڈاکٹر صاحبان کی صلح کے مطابق راشن دی جائے۔

صحبت:-

- ☆ بھیڑ بکریوں کی مختلف بیماریوں کو روکنے کے لئے ڈوزنگ اور ویکسین کا شید و سنجیدگی کے ساتھ عملایا جائے۔
- ☆ جانوروں کو، خاص طور چھوٹے جانوروں میں کوکا کسید یوس (COCCIDIOSIS) بیماری کو روکنے کے لئے کا کسید یوسٹیٹ (COCCIDIOSATS) استعمال کیا جانا چاہئے۔
- ☆ بیٹا بلک (METABOLIC) بیماری کے روک تھام کے لئے حاملہ بھیڑوں کو اضافی خوراک متعلقہ ڈاکٹر صاحبان کی مشورہ سے دیا جائے۔

المختصر:-

انفارمیشن و پبلیشی ونگ ڈائریکٹوریٹ آف شیپ ہسینڈری لال منڈی، سرینگر، کشمیر